

EC FERTLIZER

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

FERTIGOLD MICRO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)

Suda Çözünür Bakır (Cu)

Suda Çözünür Demir (Fe)

Suda Çözünür Mangan (Mn)

Suda Çözünür Çinko (Zn)

W / W


% 1

% 0,5

% 4

% 3

% 4



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Bitki Türü	Damla Sulama Uygulama Miktarı (dekara)	Uygulama Zamanı
Kavun, Karpuz, Kabak	450 – 700 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan	350 – 700 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Narenciye	450 – 700 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	450 – 700 gr	Pembe tomurcuk döneminden itibaren
Armut, Elma, Ayva	350 – 700 gr	Pembe tomurcuk döneminden itibaren
Çilek,	350 – 600 gr	Fide dikiminden itibaren
Bağ, Kivi	350 – 600 gr	Göz kabarmasından itibaren
Muz	350 – 700 gr	Doğum öncesinden itibaren
Zeytin	450 – 700 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Ş. Pancarı, Patates, Havuç	450 – 700 gr	İkinci çapadan sonra
Kanola, Buğday, Çeltik	450 – 700 gr	Kardeşlenme döneminden itibaren
Mısır, Ayçiçeği	450 – 700 gr	Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemden itibaren
Pamuk	350 – 700 gr	Çapadan sonra
Nohut, Fasulye, Mercimek	350 – 600 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Ceviz, Fındık, Antep Fıstığı	350 – 700 gr	Çiçeklenme öncesinden itibaren
Soğan, Sarımsak	350 – 600 gr	Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemden itibaren
Yeşil Alanlar, Kesme Çiçekler	350 – 600 gr	Gelişme dönemi boyunca
Marul, Ispanak, Lahana, Brokoli	350 – 450 gr	Gelişme dönemi boyunca

FERTIGOLD MICRO' nun damla / yağmurlama sulama sistemi ile uygulaması yapıldığında Uygulama dozu 10 – 15 günlük aralıklarla 1 ton suya 350 – 700 gram gelecek şekilde olabilir.

Genel Prensip: FERTIGOLD MICRO en güvenilir etkiyi küçük dozlarda sık sık uygulandığında gösterir. Uygulamaları gün içinde yoğun fotosentez aktivitesinin olduğu sabah erken veya akşamüzeri yapınız.

Yağmurlama ile verildiğinde, sulamanın son anlarında FERTIGOLD MICRO' sulama sistemine verilmeye başlanır ve gübre bittikten yağmurlama bir süre daha çalıştırılır. Bu uygulamada tablodaki damla sulama dozlar bir kat artırılabilir.

FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur.

KARIŞABİLİRLİK:

FERTIGOLD MICRO her türlü ruhsatlı gübre ve zirai ilaçlarla KARIŞABİLİR. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila 45 °C arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerindeki ok (↑) işaretine uygun istiflenmelidir.

SETO SEBZE TOH. GÜB. ÜRT. İNŞ.
TUR. VE SAN. TİC. A.Ş.
Org. San. Böl. Gelişme Alanı 2. Kısım
24. Cad. No. 20 Döşemeleti / ANTALYA

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili