

EC FERTİLİZER
BORİK ASİT
PLANTA BOR

GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda Çözünür Bor (B)

W / W
%20

KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Bitki Türü	Uygulama Zamanı	Uygulama Sıklığı	100 Litre su ile birlikte	Toprakтан Uygulama (dekara)
Bağ, Kivi	1. uygulama: Göz kabarmasında 2. uygulama: Çiçeklenmeden önce	15-20 gün ara ile	50 - 75 gr	125 - 150 gr
Bezelye, Fasulye, Soya ve Baklagiller	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır.	10-15 gün ara ile	60- 75 gr	100 - 125 gr
Buğday, Arpa, Çeltik	Kardeşlenme döneminde		50- 75 gr	75 - 100 gr
Çilek	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce 2. uygulama: İlk uygulamadan 15 gün sonra	10-15 gün ara ile	60 - 75 gr	125 - 150 gr
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde uygulanır.	10 gün ara ile	50 - 80 gr	125 - 150 gr
Fasulye, Nohut, Mercimek	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır. Gelişme dönemi boyunca	15-20 gün ara ile	50 - 75 gr	125 - 175 gr
Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Badem	Çiçeklenmeden önce		75 - 100 gr	150 - 200 gr
Havuç	Bitkiler 10-15 cm boya erişince kullanılır.	10-15 gün ara ile	75 - 100 gr	100 - 125 gr
Kanola	Gövde genişlemeye başlarken kullanılır.		80 - 100 gr	125 - 150 gr
Karpuz, Kavun, Kabak	1. uygulama: Fide dikiminden sonra, 2. uygulama: ilk uygulamadan 15 gün sonra	15 gün ara ile	50 - 75 gr	75 - 100 gr
Kiraz, Vişne, Şeftali, Kayısı, Erik	1. uygulama: Çiçeklenmeden önce, 2. uygulama: Hasattan sonra		80 - 125 gr	125 - 150 gr
Lahana, Brüksel lahanası, Karnabahar, Brokoli	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır.	10-15 gün ara ile	75 - 100 gr	100 - 125 gr
Marul, Kıvrıkcık salata	Çıkıştan veya şaşırtmadan 10-15 gün sonra uygulanır.	10-15 gün ara ile	25 - 50 gr	75 gr
Mısır, Ayçiçeği	Bitki boyunun 15 - 20 cm olduğu dönem ve sonrası	15-20 gün ara ile	50 - 75 gr	125 - 175 gr
Muz	Çiçeklenmede, doğum dönemi, hasat öncesi	3 hafta ara ile	80 - 125 gr	125 - 175 gr
Narenciye	Hasattan sonra çiçeklenmeden önce	15-20 gün ara ile	50 - 75 gr	125 - 175 gr
Pamuk	Çiçeklenmeden hemen önce uygulanır. Gerek görülürse aynı doz koza oluşumundan sonra tekrarlanır.		50- 75 gr	125 - 175 gr
Patates	1.uygulama %100 çıkıştan 1 hafta sonra, 2.uygulama 10-14 gün sonra, 3.uygulama ise yumru teşekkülü esnasında	10-15 gün ara ile	50 - 75 gr	50- 100 gr
Şeftali, Kiraz, Kayısı, Erik	Çiçeklenme öncesi gözler uyanırken ve pembe göz döneminde ayrıca hasat sonrasında yapraklar dökülmeden kullanılır.		50 - 75 gr	50 - 100 gr
Soğan, Sarımsak	Püskürtmeye elverişli yeterli yaprak yüzeyi oluştuğunda kullanılır		50 - 75 gr	75 - 125 gr
Şekerpancarı, Şalgam	Bitkilerin 4-6 yapraklı döneminde kullanılır	10-15 gün ara ile	60-80 gr	75 - 100 gr
Tütün	Tarla dönemi başlangıcından itibaren 15 gün arayla 2 kere uygulanır.		50- 75 gr	30- 50 gr
Yeşil alanlar	Gelişme dönemi boyunca		50 - 75 gr	30 - 50 gr
Elma, Armut, Ayva vb	Gözler patladığında ve taç yapraklar dökülünce ve hasat sonrası yapraklar dökülmeden kullanılır, Çiçeklenme döneminde kullanılmaz.		100 – 125 gr	80 - 100 gr
Zeytin	Çiçeklenmeden önce ve çiçeklenme sonrası		75 - 100 gr	125 - 150 gr

Düşük doz hafif, yüksek doz ağır topraklarda uygulanır. Dekara uygulamada verilen dozlar 1 Ton su hesabı ile verilmiştir.

KARIŞABİLİRLİK

PLANTA BOR kalsiyum ve bakır hariç her türlü ruhsatlı gübre ve zirai ilaçlarla KARIŞABİLİR. Diğer bitki besleme veya koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön deneme yapınız.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
SETO
SEBZE TOHUMLARI GÜBRE ÜRETİM
İNŞAAT TURİZM ve SAN. TIC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA
Tel: 0242 258 02 26 27 28 Fax: 258 14 16
Ant. Kurumlar V.D. 764 002 4553

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI

Asla uygun doz miktarını aşmayınız sadece gerekli olan yerde kullanınız. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Önce etiketi okuyunuz ve evde kullanmayınız. Uygulama esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz ve buharını ve zerrelere teneffüs etmeyiniz. Deri ve göz ile temasından kaçınınız temas halinde temas bölgesini bol su ile yıkayınız. Boş ambalajları imha ederek doğayı kirletmeyiniz. **Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.**

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda +5 ila 30 °C arasında saklanmalıdır. Taşıma ve depolama sırasında kesinlikle ters çevrilmemelidir. Üzerindeki ok işaretine uygun istiflenmelidir.

FİRMA BEYANI

Firma ürününü, etikette belirtilen şartlara uygun olarak kullandığı takdirde garanti eder. Yanlış kullanımdan dolayı meydana gelecek zararlardan tüketici sorumludur.

Tescil No: Üretim Tarihi: Parti No:
Lisans No: Son Kul. Tarihi: Net Ağırlık: 0.25-0.5-1-2-5-10-15-18-20-30 kg

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ!
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ!



ÜRETİCİ FİRMA: SETO SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM İNŞAAT TURİZM VE SANAYİ TİC. A.Ş.
ADRES: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı 2.Kısım 24.Cadde No:20 ANTALYA / TÜRKİYE
Tel: 0242 258 02 26 - 0242 258 02 27 - 0242 258 02 28 **Fax:** 0242 258 14 16
info@seto.com.tr / www.seto.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
SETO
SEBZE TOHURLARI GÜBRE ÜRETİM
İNŞAAT TURİZM VE SAN. TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı
2.Kısım 24.Cad. No:20 07190 ANTALYA
Tel: 0242 258 02 26 - 0242 258 02 28 Fax: 258 14 16
Ant. Kurumlar V.D. 764 002 4553